

**PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA
CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS**

Martinelli y col., 2012

Traducido al español por: Franklin Susanibar y Jenny Castillo (Perú)

HISTORIA CLÍNICA

Nombre y apellidos: _____	FN: / /	
Fecha de examen: / /	Género: M () F ()	
Nombre de la madre: _____		
Nombre del padre: _____		
Dirección: _____	Nº: _____	
Distrito: _____	Ciudad/estado: _____	Seguro Med.: _____
Teléfonos: () _____	() _____	() _____
Casa	Trabajo	Celular
Correo electrónico: _____		

Antecedentes familiares (Investigar si existen casos en la familia con alteración del frenillo de la lengua) () No (0) / () Si (1) ¿Quién y que dificultad presenta? _____
Problemas de salud: () No () Si ¿Cuáles?: _____

Lactancia materna:
• ¿Cuál es el tiempo entre tomas? () 3h (0) () 2h (0) () 1h o menos (2)
• ¿Presenta cansancio al lactar? () No (0) () Si (1)
• ¿Lacta un poco y se duerme? () No (0) () Si (1)
• ¿Va soltando el pezón? () No (0) () Si (1)
• ¿Muerde el pezón? () No (0) () Si (2)

Puntuación total de la historia clínica: Mejor resultado = 0

Peor resultado = 8

**PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA
CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS**

Martinelli y col., 2012


Traducido al español por: Franklin Susanibar y Jenny Castillo (Perú)

EXAMEN CLÍNICO

(se sugiere filmar para realizar un análisis posterior)

PARTE I – EVALUACIÓN ANATOMOFUNCIONAL

1. Postura habitual de labios



() Labios cerrados (0)



() Labios entreabiertos (1)



() Labios abiertos (1)

2. Tendencia de la posición de la lengua durante el llanto



() Lengua en la línea media (0)



() Lengua elevada (0)



() Lengua en la línea media con elevación de los laterales (2)



() Lengua baja (2)

3. Forma de la lengua cuando se eleva durante el llanto



() Redondeada (0)



() Ligera fisura en ápice (2)



() Forma de corazón (3)

**PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA
CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS**

Martinelli y col., 2012

Traducido al español por: Franklin Susanibar y Jenny Castillo (Perú)

4. Frenillo de la lengua



() Se puede visualizar



() No se puede visualizar



() Visualizado con maniobra*

EN CASO DE NO SER OBSERVADO, PROSEGUIR CON LA SEGUNDA PARTE (Evaluación de las funciones orofaciales)

4.1 Espesor del frenillo



() Delgado (0)



() Grueso (2)

4.2 Fijación del frenillo en la cara sublingual (ventral) de la lengua



() En el tercio medio (0)



() Entre el tercio medio y el ápice (1)




() En el ápice (3)

4.3 Fijación del frenillo en el piso de la boca



() Visible a partir de las carúnculas sublinguales (0)



() Visible a partir de la cresta alveolar inferior (1)

* Maniobra de elevación y posteriorización de la lengua.

Si no se observa, acompañar el caso.

Puntuación total de la evaluación anatomofuncional: Mejor resultado = 0 Peor resultado = 12

**PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA
CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS**

Martinelli y col., 2012

Traducido al español por: Franklin Susanibar y Jenny Castillo (Perú)

PARTE II – EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES OROFACIALES

1. Succión no nutritiva (succión del dedo meñique con guante)

1.1. Movimiento de la lengua

- adecuado: protrusión lingual, movimientos coordinados y succión eficiente (0)
- inadecuado: protrusión lingual limitada, incoordinación de movimientos y demora para iniciar la succión (1)

2. Succión nutritiva (próxima a la hora de lactar, observar al bebé lactando durante 5 minutos)

2.1. Ritmo de succión (observar grupos de succión y pausas)

- varias succiones seguidas con pausas cortas (0)
- pocas succiones con pausas largas (1)

2.2. Coordinación entre succión/deglución/respiración

- adecuada (0) (equilibrio entre la eficiencia alimenticia y las funciones de succión, deglución y respiración, sin señales de estrés)
- inadecuada (1) (tos, náuseas, disnea, regurgitación, hipo, ruidos durante la deglución)

2.3. “Muerde” el pezón

- No (0)
- Si (2)

2.4. Chasquidos durante la succión

- Ninguno (0)
- Asistemáticos (1)
- Frecuentes (2)

Puntuación total de la evaluación de las funciones orofaciales:

Mejor resultado = 0 Peor resultado = 7

PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL DE LAS PRUEBAS: Mejor resultado = 0 Peor resultado = 27

Cuando la suma de la historia y del examen clínico es igual o mayor que 9, se puede considerar al FRENILLO DE LA LENGUA como ALTERADO.

CLASIFICACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA EN BEBES – MARTINELLI, R


Frenillos normales



Frenillos cortos



Frenillos con fijación anteriorizada



CLASIFICACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA EN BEBES – MARTINELLI, R
Frenillos cortos y con fijación anteriorizada



Frenillos submucosos



Anquiloglosia

